

Рекомендации по применению измерений пресепсина

утверждённые Федерацией Лабораторной Медицины,
утвержденные в МЗ РФ и опубликованные в ФЭМБ.

Ссылка на страницу на сайте ФЛМ:

http://www.fedlab.ru/minzdrav/prof_com/klinicheskie-rekomendatsii-profilnoy-komissii/klinicheskie-rekomendatsii-predstavlennye-v-profilnuyu-komissiyu.php

Данные для поиска в ФЭМБ:

15122014/1. Использование биомаркера "Пресепсин" для ранней и высокоспецифичной диагностики сепсиса. 15 ноября 2014 года.
Впервые. Протокол утверждения в ФЛМ.

Расположение в [Федеральной электронной медицинской библиотеке](#):

Основное заглавие: Использование биомаркера «Пресепсин» для ранней и высокоспецифичной диагностики сепсиса

Сведения, относящ. к заглавию: клинические рекомендации

Сведения, относящ. к заглавию: тип клинических рекомендаций: Правила проведения клинических лабораторных исследований

Ответственность: Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»

Последующие сведения об ответственности: [разработчик В. В. Вельков]

Основное заглавие серии: Национальные клинические рекомендации

Библиография: Библиогр.: с. 37-41 (107 назв.)

Рубрика MeSH: СЕПСИС - диагностика

Рубрика MeSH: БЕЛКИ ОСТРОЙ ФАЗЫ - выделение и очистка

Рубрика MeSH: БЕЛКИ ОСТРОЙ ФАЗЫ - диагностическое применение

RUGASNTI: 76.29.50

RUGASNTI: 76.03.53

RUGASNTI: 76.01.33

Язык текста: rus

05 февраля 2015 года.